

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

Cozza pelosa o modiola viva nazionale (*Modiolus barbatus*)

Conchiglia con 2 valve con esterno peloso, oblunga. Colorazione bruno-rossastra all'esterno, madreperlacea all'interno.
Lunghezza dai 4 ai 9 cm.



Canestrello (*Chlamys varia*)

Codice FAO SQC. Area di Pesca: Mediterraneo, presente anche nell'Atlantico orientale, dalla Norvegia al Senegal. Vive su fondali sabbiosi di poca profondità.




Cannolicchio (*Ensis (minor) siliqua*)

Codice FAO SQC. Area di Pesca: Mediterraneo, presente anche nell'Atlantico orientale, dalla Norvegia al Mar Baltico al Marocco. Vive su fondali sabbiosi di poca profondità.



Cappasanta o Conchiglia di San Giacomo (*Pecten Jacobeus*)

Codice FAO SJA. Area di Pesca: Mediterraneo; tutti i mari italiani (in particolare in alto Adriatico); presente nell'Atlantico occidentale dal Portogallo al Marocco. Predilige fondali arenosi e sabbiosi.



Cozza o Mitilo (*Mytilus galloprovincialis*)

Codice FAO MSM. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero, presente anche nell'Atlantico orientale: Allevata in filari in tutto l'Adriatico, in Sardegna e nel Golfo ligure. Stagionalità di Pesca: la specie allevata presenta maggiore accrescimento nei mesi primaverili, durante i quali viene raccolta in notevoli quantitativi. La pesca vera e propria viene effettuata solo da subacquei. Sistemi di Pesca: Pesca subacquea nelle rocce o piattaforme.




Fasolaro (*Callista Chione*)

Codice FAO CLV. Area di Pesca: Mediterraneo; anche Atlantico orientale, dalle Isole britanniche al Marocco. Predilige i fondali sabbiosi di poca profondità. Specie interessata all'acquacoltura. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: turbosoffianti e draghe idrauliche. Leggi: si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo 530/92 e successive modifiche. Sono previsti periodi di fermo biologico come le vongole.




Lumachino Bombolino (*Nassarius mutabilis*)

Codice FAO WHE. Area di Pesca: Mediterraneo. Molto comune sui fondali sabbiosi di poca profondità, fino a 20 metri. Stagionalità di pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: reti a strascico e nasse (in particolare queste ultime in quanto la specie è ghiotta di animali in decomposizione, che vengono messi dentro le nasse come esca).



Ostrica concava (*Cassostrea gigas*)

Codice FAO OYG. Area di Pesca: Il genere *Cassostrea* ha specie significative su tutto il pianeta, dalla *C. gigas* di origine giapponese, alla *C. virginicas* presente nell'America del Nord, alla *C. commercialis* di origine australiana, alla *C. angulata* originaria delle coste del Portogallo fino alla *C. rhizophorae* originaria del Mar dei Caraibi. Nel Mediterraneo e in tutti i mari italiani la specie autoctona è la *Ostrea edulis*, ma nell'allevamento prevale il genere *Crassostrea*.



Ostrica o Ostrica piatta (*Ostrea edulis*)

Codice FAO OYF. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche nell'Atlantico orientale, dalla Norvegia al Marocco. La specie è allevata ed ormai viene commercializzata solo la notevole produzione ottenuta dall'ostreicoltura. Stagionalità di Pesca: E' collegata allo stadio di accrescimento della specie secondo le esigenze e le tecniche di allevamento; viene raccolta e venduta tutto l'anno ma in particolare da Ottobre in Aprile.



Tartufo o Noce (*Venus verrucosa*)

Codice FAO CLV. Area di Pesca: Mediterraneo; presente anche Atlantico orientale, dalle Isole britanniche all'Angola e sud Africa fino all'Oceano Indiano. Stagionalità di Pesca: Si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: Turbo soffianti e draghe idrauliche.



Tellina (*Donax trunculus*)

Codice FAO TWL. Area di Pesca: Mediterraneo e Mar Nero; anche Atlantico orientale, dalla Bretagna Meridionale (Francia) al Senegal. Stagionalità di Pesca: si pesca tutto l'anno. Sistemi di Pesca: A mano con attrezzi da scavo, turbo soffianti e draghe idrauliche (meno frequenti).



Vongola (*Venus (chamelea) gallina*)

Codice FAO SVE. Area di Pesca: Mediterraneo (in particolare nel Mar Adriatico) e nel Mar Nero; presente anche nell'Atlantico orientale dalla Norvegia al Marocco, nonché nel Mar Caspio. Vive su fondali sabbiosi ed arenosi poco profondi. Stagionalità di Pesca: si pesca in particolare nei mesi invernali e primaverili. Specie interessata dall'acquacoltura. Sistemi di Pesca: Pesca con rastrello e turbo soffiante.

